

ジクトル[®]テープ 75mg を 使用されている方へ

ご使用の際には、必ずお読みください。

ジクトル[®]テープ 75mg について



このお薬は有効成分を皮膚から吸収させるようにした貼付剤で、痛みを抑える働きがあります。

このお薬は1日1回貼るお薬です。

✓ 担当の医師に指示された貼付部位及び1日あたりの使用枚数を守ってください。

✓ 指示なしに使用枚数を変更することは絶対にしてはいけません。


✓ 本剤は、貼った場所でなく全身に作用するため、他の消炎鎮痛剤との併用は避けてください。
痛み止め*、解熱剤*、風邪薬*を使用する場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
*非ステロイド性消炎鎮痛剤を含む薬



貼る場所

胸、お腹、上腕、背中、腰又は太ももに貼ってください。

※ 皮膚への刺激を減らすために、貼り替えるときは、前回とは異なる場所に貼ってください。



✓ 処方された患者さん以外はお使いにならないでください。



✓ 妊婦又は妊娠している可能性のある患者さんはお使いにならないでください。



使用するときの注意

- 赤みやかゆみ、傷がない場所に貼ってください。
- お薬がはがれ落ちた場合は、すぐに新しいお薬を貼り、次の貼り替えは、いつもの時間に貼り替えてください。

保管上の注意

- 包装袋は貼る直前まで開封しないでください。
- このお薬は子どもの手や目の届かない所に保管してください。
- 高温にならない場所で保管してください。
- 7枚入りの場合、使用する枚数を取り出した後はチャックを閉めて保管してください。また、開封日より30日を超えた場合には使用しないでください。




副作用に関する注意

- 副作用として貼った箇所の皮膚症状(赤くなる、かゆみなど)が報告されています。
- このお薬を使用して体調不良などを感じる事があれば、医師または薬剤師にご相談ください。

使用したあとの注意

- ゆっくりと優しく皮膚からはがしてください。
- 使用済みのお薬には成分が残っているため、粘着面を内側にして折りたたんでください。また子どもの手や目の届かないところに捨ててください。
- このお薬の包装はプラスチック製です。捨てる時は各自治体の分別ルールに従ってください。
- お薬をはがしたあとは、手を目に触れず、手を水でよく洗ってください。



ジクトル®テープ75mgの貼り方



貼る場所をよく拭いて清潔にしてください。また水分や汗は十分に取除いてください。



お薬を取り出してください。



フィルムを折り返して片手で持ち、まん中のフィルムをはがします。



そのまま粘着面を貼ります。



片方ずつフィルムを引っぱりながら貼ります。



お薬を貼ったあとは、手を水でよく洗ってください。

「上手な貼り方」を掲載しています



包装袋裏面の「二次元コード」を携帯電話またはスマートフォン、タブレットで読み取ると、貼り方が閲覧いただけます。読み取れない場合は下記のアドレスを入力してください。
<http://www.harikata.jp/z75.html>

使用方法、副作用など詳しい質問がある場合は、医師または薬剤師にお尋ねください。

製造販売元



久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地