

Hisamitsu

アポハイド[®]ローション20%を 使用されている方へ

ご使用の際には必ずお読みください。

このお薬は皮膚から吸収されて、手のひらの汗を抑えるお薬です。
1日1回就寝前に使用してください。

子どもの手や目の届かないところに保管してください。

使い方



1 手のひらの水分などをよく拭いてください。



2 手のひらにお薬を適量出してください。

(両手1回分の目安は5プッシュです。)

※新しいお薬を最初に使うときは、お薬が出てくるまでティッシュペーパーなどで3～4回ポンプを空押ししてください。



3 左右の手のひらに均等に塗り広げてください。

※手のひら以外の部位には使用しないでください。

※お薬を塗った手で絶対に目をさわらないでください。
万が一目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。



4 お薬を塗ったまま、就寝してください。

※お薬が乾くまで寝具などに触れないようにしてください。



5 起床後は、手を流水でよく洗ってください。

※手を洗ったあと、再度お薬を塗る必要はありません。



◀アポハイド[®]ローション20%の
使い方を動画でもご覧いただけます。
<https://www.harikata.jp/a57html>

裏面も必ずお読みください。→

医師または薬剤師の指示に従って使用してください。

子どもの手や目の届かないところに保管してください。

使用するときの注意

- 手のひらに傷や湿疹、皮膚炎などがある場合は、このお薬を使用してよいが、医師または薬剤師に相談してください。
- お薬を塗った後は、お薬が意図せず洗い流されないよう、手が濡れる行為は避けてください。
- 起床後に手を洗うまでの間は、塗った箇所以外(目や口など)をさわらないでください。さわった場合は、すぐに水で洗い流してください。
- お薬を塗った手を、気密性の高いゴムやビニール、シリコンなどの手袋で覆わないようにしてください。
- 処方された患者さん以外には使用しないでください。

保管上の注意

- 子どもが誤ってお薬を使用しないように、子どもの手や目の届かないところに保管してください。
- 可燃性の成分を含むため、火気を避けて保管・使用してください。
- 高温にならない場所で保管してください。

捨てるときの注意

- このお薬が残っている場合は、火気を避けてお薬を紙や布などに吸収させ、可燃ごみとして捨ててください。
- このお薬のボトルはプラスチック製です。各自治体の分別ルールに従って捨ててください。



キャップ: PET
ポンプ: PP, PE
ボトル: PE, PP
袋: PP, PE

何かが異常が認められた場合には、お薬の使用を中止し、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。



製造販売元
久光製薬株式会社
〒841-0017 長崎市田代大宮町408番地

作成年月: 2025年5月

AHL5006R02