

ドロエチ® 配合錠「バイエル」

ウォレットパッケージ (外面)



※イメージ図
サイズは実物大

製造販売元: バイエル ライフサイエンス株式会社

発売元:  久光製薬株式会社

ドロエチ® 配合錠「バイエル」

ウォレットパッケージ（中面）

服用中に**血栓症（血管内に血のかたまりが詰まる病気）**があらわれることがあります。次のような症状があらわれた場合は、すぐに**救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害（見えにくいところがある、視野が狭くなる）など

次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。症状が軽くて**飲むのをやめてすぐに医師に相談**してください。

- 足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、嘔吐（おうと）・吐き気 など

次のような状態になった場合、飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。


- 体を動かさない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

服用中は、医療機関でもらった「患者携帯カード」を常に持ち歩き、他の診療科、医療機関を受診する際は必ず医師に提示してください。

服用開始日	→	次回服用開始日
月 日 ()		月 日 ()


1～24番目の錠剤（淡赤色錠）を飲み忘れた場合



※ 25～28番目の錠剤（白色錠）を飲み忘れた場合は飲んだものと見なし、その後は通常通り継続してください。

1625HB

91557724



DroEthi® Combination Tablets

最上部の□に服用を開始する曜日から記載してください。

※イメージ図
サイズは実物大

製造販売元：バイエル ライフサイエンス株式会社

発売元： 久光製薬株式会社