


ドロエチフレックス® 配合錠「バイエル」

ウォレットパッケージ (外面)



※イメージ図
サイズは実物大

製造販売元: バイエル ライフサイエンス株式会社

発売元:  久光製薬株式会社

ドロエチフレックス® 配合錠「バイエル」

ウォレットパッケージ (中面)

服用中に**血栓症(血管内に血のかたまりが詰まる病気)**があらわれることがあります。次のような症状があらわれた場合は、すぐに**救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害(見えにくいところがある、視野が狭くなる) など

次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。症状が軽くても飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

- 足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、嘔吐(おうと)・吐き気 など

次のような状態になった場合、飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

- 体を動かせない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起きやすくなります。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

服用中は、医療機関でもらった「患者携帯カード」を常に持ち歩き、他の診療科、医療機関を受診する際には必ず医師に提示してください。

服用方法について
医療機関で指示された服用方法にしたがって服用してください。
服用方法は二次元コードからご確認ください。

最長120日間の連続服用と4日間の休薬を繰り返す方法



28日周期で服用する方法




服用開始日	出血日	休薬日	次回服用開始日	現在のシート数
月 日	月 日 月 日	月 日 ~ 月 日 (4日間)	月 日	シート目

飲み忘れた場合

1錠飲み忘れ → **気付いた時点** → **いつもの飲む時刻** → **翌日から**
 2錠以上飲み忘れ → **まず1錠を服用** → **もう1錠を服用** → 通常どおり服用
 4日以上飲み忘れた場合は医師にご相談ください

1625HB

91557953



DroEtiFLEX® 最上部の□に服用を開始する曜日から記載してください。
 Combination Tablets 錠剤の上側の□に服用何日目か数字で書いてください。

※イメージ図
サイズは実物大

製造販売元: バイエル ライフサイエンス株式会社

発売元: 久光製薬株式会社