

ネオキシテープ[®] 73.5mg は “貼る”過活動膀胱のお薬です

使い方


1日1回1枚を**下腹部、腰、太ももの**
いずれか1ヶ所に貼ってください。

お薬を同じ位置に続けて貼ると、かゆくなったり、赤くなったり、かぶれたりすることがあります。必ず、毎日貼る位置をかえましょう。

● 場所をかえて貼りかえる例



● 同じ場所の中で位置をかえる例



ネオキシテープ 73.5mg を 処方された患者さんへ

貼る時の注意

- このお薬は毎日貼りかえるため、貼りかえのタイミングは入浴前後がおすすです。
- 傷口や湿疹・皮膚炎などのあるところには貼らないでください。
- あらかじめ貼る場所をよく拭いて、水分や汗を十分に取り除き清潔にしてください。

はがれないための注意

- 衣服とのこすれでお薬がはがれることがあります。
 - ・衣服を着脱の際には、はがれないよう十分にご注意ください。
 - ・ベルトなどがあたるところに貼るのは避けてください。

その他の注意

- 貼り忘れた時や途中ではがれた場合は、気が付いた時にすぐに新しいお薬を貼ってください。
また、次の貼りかえの時間には新しいお薬に貼りかえてください。
- このお薬を使って、気になる症状があった場合には、医師または薬剤師に相談してください。