

セクター[®] (ゲル3%・クリーム3%・ローション3%) を 使用されている方へ

このくすりを使用していた部位に発疹・発赤、はれなど、**接触皮膚炎**又は**光線過敏症**が起き、全身へ拡がる重篤な例が報告されています。


1. 次の方は使用前に必ず主治医又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 光線過敏症と診断されたことがある人
- (2) 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことがある人

2. 過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれなどのかぶれ)があらわれたら、すぐに使用を中止し患部を遮光して主治医又は皮膚科専門医にご相談ください。

3. 塗ったところを日光にあてないでください。*

- ① 海水浴、ゴルフ、テニスなど外での活動はひかえてください。
- ② 外に出るときは、晴れた日だけでなく曇りの日でも、濃い色の服(長袖やスラックス)や、サポーターなどで、塗ったところを日光からさえぎってください。
- ③ 使用後も、少なくとも4週間は同じように注意してください。



*特に20歳未満の人は、部活動や体育行事などで日光にあたる機会が多く、かぶれが発現する可能性が高いと考えられますのでご注意ください。

●その他の注意事項

妊娠後期の女性は使用しないでください。

