

久光製薬株式会社 塗布剤の使い方

経皮鎮痛消炎剤
ジクロフェナクナトリウムゲル

薬価基準収載

ナボール[®]ゲル 1%

NABOAL Gel 1%


使用方法

△注意

- 1日数回、適量を痛いところとそのまわりにすり込んでください。
- 関節部位は、その周囲全体にすり込んでください。

使用量の目安

ひざ、肩、腰など
ゲル約指 2～3 本巾
ひじ、手首など
ゲル約指 1～2 本巾



- 本剤の使用により、皮膚のかゆみ、かぶれ、発赤などの症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 目や粘膜面（口の中など）、きず口には使用しないでください。（また、本剤を使用した手で、そのまま目や粘膜面、きず口にふれないでください。）
- 本剤をぬった上から、通気性のないラップや油紙などでおおわないでください。
- 使用後は必ずキャップをよくしめて、直射日光をさけ涼しいところに保管してください。また、チューブロを下に向け、立てて保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェン ゲル

薬価基準収載

セクター[®]ゲル 3%

SECTOR Gel 3%

使用方法


△注意

- 1日数回、痛いところを中心に軽くすり込んでください。
- 関節部位に使う場合は、そのまわり全体に軽くすり込んでください。

使用量の目安

- 1回の使用量は患部により異なります。
- 人差指関節（図を参照）に相当する量を1回分として、以下を目安にご使用ください。

ひざ、肩、腰など
1～2 回分
ひじ、手首など
1 回分
手足の指など
1/2 回分



経皮鎮痛消炎剤
ケトプロフェン クリーム

薬価基準収載

セクター[®]クリーム 3%

SECTOR Cream 3%

使用方法

△注意

- 1日数回、痛いところを中心に軽くすり込んでください。
- 関節部位に使う場合は、そのまわり全体に軽くすり込んでください。

使用量の目安

- 1回の使用量は患部により異なります。
- 人差指関節（図を参照）に相当する量を1回分として、以下を目安にご使用ください。

ひざ、肩、腰など
1～2 回分
ひじ、手首など
1 回分
手足の指など
1/2 回分

